

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPECE
D'*OXYLEMUS* (COLEOPTERA : *Colydiidae*).

PAR A. GROUVELLE.

(*Communicated by Arthur M. Lea*).

OXYLEMUS LEÆ, n.sp.

Elongatus, subcylindricus, nitidus, parce et sat longe pilosus, niger vel nigro-piceus, antennis, angulo apicali elytrorum pedibusque rufis; capite in medio laevi, ad latera dense profundeque punctato; clava antennarum in glandis speciem; prothorace subelongato, sat dense punctato, lateribus basique marginatis, hac arcuata, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis; scutello minimo, punctiformi; elytris elongatis, ad apicem conjunctim rotundatis, punctatostriatis, intervallis striarum uni-lineato-punctatis, punctis remotis, stria suturali magis impressa, aliis ad apicem deletis, 2^o intervallo ad apicem elevato, spatio inter suturam et carinam subconcano. Long. 4.5 mill.

Allongi, subcylindrique, brillant, couvert d'une pubescence formée principalement de poils longs, dressés, rares sur le disque du prothorax et des elytres, plus dense sur les côtés et de poils également longs et rares, mais couchés insérés surtout sur la tête et le devant du prothorax; tête et prothorax noirs, elytres brun de poix à reflets très, légèrement bronzé, un peu rougeâtre à la base, dans la région scutellaire et au sommet; antennes et pattes rougeâtres. Antennes terminées par un article en forme de gland, composé très probablement d'un premier article lisse, emboitant la base d'un article oblong, pubescent. Tête lisse sur le milieu, densément et fortement

ponctué sur les côtés, bouche rougeâtre. Prothorax à peine d'un quart plus long que large, assez densément et fortement ponctué; bords latéraux et base finement rebordés; sommet subtronqué à peine senni dans le milieu, base arquée; angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus. Ecusson petit, suborbiculaire. Elytres environ quatre fois plus longs que larges ensemble, arrondis ensemble au sommet, ponctués-striés; strie suturale entière, bien marquée, les autres effacées au sommet; intervalles à peine vieillement rugueux, chacun avec une ligne de points espacés; 2^{me} intervalle sans compter l'intervalle sutural élevé vers le sommet, espace compris entre cette pseudo-carine et la suture légèrement concave. Metasternum sans sillon longitudinal, finement strié; 1^{er} segment de l'abdomen ponctué sur toute la surface.

Hab.—Tasmanie: Mont Wellington, Frankford, Hobart, Zeehan.

Cette espèce m'a été obligeamment communiquée par Mr. Lea qui m'a autorisé à la décrire.